

치료중이거나 약복용, 예방접종 등 관련 한혈 가능 조건

당일 복용도 가능	고지혈증약, 비염 (항히스타민제만), 소화제, 혈압약, 당뇨약, 수면제
1일 경과 후	단순진통제(게보린, 타이레놀 등 두통약), 종합감기약 예방접종: 독감, 가디실, A형 간염 등(*B형 간염은 2주 경과
3일 경과 후	처방전 감기약, 진통소염제, 아스피린 (단 종합감기약과 단순 감기약은 1일 경과 후 가능)
1주일 경과 후	피부약, 항생제 (약조유에 따라 가능여부판단)
4주 경과 후	외국여행(국가무관), 내시경, 여드름 / 탈모치료제 4주 후 가능 예방접종: BCG접종, MMR(홍역, 풍진 백신), 수두 등
6개월 경과 후	문신, 침술, 사혈부항 (단, 의료기관에서 하신 문신은 4주 후 가능, 1회용 침술, 부항만 하신 경우는 3일 경과 후 가능)
귀뚫음(피어싱)	1회용 사용일 경우 4주 경과 후 가능 (1회용이 아닐 경우 6개월 후 가능)
사혈부항	부항컵이 1회용일 경우 3일 후 가능 1회용이 아닌 소독컵인 경우 6개월 경과 후 가능
코로나19, 독감	코로나: 확진해제 종료일로부터 10일 경과 후 가능 독감: 완치 후 1개월 경과 후 가능